



FLORCAP 5%

Acción protectora anti-bacterial

Nombre comercial: florvet 5%

Funcionalidad: Bactericida, bacteriostático.

Característica específica de aspecto físico: polvo amorfo

Color: blanco amarillento

Olor: característico

Contenido: Florfenicol 50 g excipientes CSP 1000 gr

Esterilidad: mesófilos aerobios: no más de 100 ufc Mohos y levaduras: no más de 100 ufc.

Presentación: pre mezcla en alimento. Bolsas 1, 10 Kg

Indicación terapéutica: tratamiento de infecciones ocasionadas por Actinobacillus Pleuropneumoniae E. Coli, S. suis, Pasteurella SP, Bordetella Bronchiseptica. Antibiótico de amplio espectro en caninos, EHRlichia canis.

Mecanismo de acción: antibiótico de amplio espectro, de tipo bacteriostático, Inhibidor de la síntesis proteica a nivel de la subunidad Ribosomal 50s.

Especies recomendadas: peces, cerdos

Dosificación: recomendada por EMEA (Europa) y F.D.A. PECES: 10 mg de Florfenicol/Kg de biomasa, por 5-7 días. Equivale a 200 gramos día de Florvet al 5% por cada tonelada de biomasa a tratar.

Toxicidad: producto amplio margen de seguridad. A Dosis recomendadas ninguna.

Precauciones: manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa.

Periodo de retiro: en cerdos, 5 días; después del último tratamiento. (ICA) Peces: los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 12 días después de finalizado el tratamiento.

Registro ICA: 6649 MV